

CANIAVES

Medicamento de uso veterinário

AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

AIM nº 580/01/12NFVPT

COMPOSIÇÃO

Carbaril.....5,0 %
Excipiente q.b.p.....100 %

O Caniaves é composto por Carbaril que é um insecticida da família dos carbamatos. O carbaril actua por ingestão e contacto. A sua eficácia inicial é relativamente rápida tendo uma acção inicial muito pronunciada. A sua actividade pode durar até três semanas. Actua inibindo a acetilcolinesterase dos tecidos, causando acumulação da acetilcolina nas uniões colinérgicas dos neurónios e nas uniões mioneurais dos músculos e gânglios autónomos. O envenenamento também altera a função do sistema nervoso central.

FORMA FARMACÊUTICA

Pó para aplicação cutânea

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

Bisnaga de 100 gramas.

ESPÉCIES-ALVO

Cães, gatos e aves canoras e ornamentais.

INDICAÇÕES

Ectoparasiticida contra carraças (*Dermacentor variabilis*, *Otobious megnini* e *Rhipicephalus sanguineus*), piolhos (*Linognathus spp*), pulgas (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis* e *Pulex irritans*) e ácaros.

Exclusivamente para uso veterinário.

Medicamento veterinário não sujeito a receita médico veterinária.

MODO E VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

Uso externo. Polvilhar o animal no sentido inverso ao do pêlo ou das penas, procurando que o pó penetre nas camadas inferiores do pêlo atingindo a pele. Evitar atingir as mucosas (olhos, nariz, etc).

Nas aves, manter intervalos de 4 semanas entre tratamentos. Não utilizar mais de 5 g por ave.

INTERVALO DE SEGURANÇA

Não aplicável

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS

Reacções adversas

Em gatos ocasionalmente, pode surgir excitação

Sobredosagem

Dada a forma de aplicação é improvável que se produza uma sobredosagem.

Em caso de ingestão oral acidental maciça pode surgir diarreia, náuseas, hipersialia, excitação e convulsões.

Enxaguar a boca e dar de beber água abundante. Recomenda-se lavagem gástrica e tratamento sintomático.

Impedir a ingestão de óleos e gorduras que favorecem a absorção a nível intestinal

Em caso de suspeita de intoxicação, contactar o **Centro Anti-Venenos. Tel: 808250143**

Caso detecte efeitos graves ou outros efeitos não mencionados na rotulagem, informe o médico veterinário.

Contra-indicações

Não usar em animais doentes ou em convalescença.

Não tratar animais com lesões cutâneas extensas.

Não tratar cachorros e gatinhos com idade inferior a 3 meses.

Não usar em caso de hipersensibilidade conhecida à substância ativa ou a algum dos excipientes.

Não administrar a animais que destinam a consumo humano.

Não administrar a outras espécies animais para além das indicadas.

Precauções especiais de utilização

Precauções especiais para utilização em animais

Exclusivamente para uso externo.

Exclusivamente para uso externo.

Evitar o contacto do pó com os olhos do animal. Em caso de contacto acidental com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água.

Precauções especiais que devem ser tomadas pela pessoa que administra o medicamento aos animais

Lavar as mãos depois de manusear o medicamento veterinário e antes de comer, beber ou fumar.

Evitar o contacto com a pele e os olhos; se isto ocorrer lavar imediatamente com abundante água. Aplicar em zonas bem ventiladas, preferentemente ao ar livre.

Guardar o medicamento veterinário longe de alimentos ou bebidas, incluindo as dos animais.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não contaminar a água de bebedouros e as rações.

A substância ativa é irritante para os olhos e pode causar sensibilização em contacto com a pele. Evitar o contacto direto com os olhos e com a pele durante o tratamento. Usar luvas de borracha.

Em caso de contacto accidental com a pele e/ou com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água.

Este medicamento veterinário não deve ser administrado por mulheres grávidas no último trimestre da gravidez.

Em caso de ingestão accidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe a embalagem ou rótulo.

Utilização durante a gestação e a lactação

A segurança da utilização do medicamento veterinário durante a gestação dos mamíferos e durante a postura de ovos em aves não foi determinada. Não administrar a aves durante a fase de postura. Não administrar durante a gestação.

Interações medicamentosas e outras formas de interação

Tal como para outros agentes antiparasitários, não usar concomitantemente com outros inseticidas.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco, seco e protegido da luz.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS

O medicamento veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com os requisitos nacionais. A eliminação do medicamento veterinário e dos seus desperdícios, deve acautelar a contaminação de cursos e de outras fontes de água. Perigoso para peixes. Não contaminar não contaminar fontes, poços e cursos de água com restos de produto.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM)

Vet Permutadora – Produtos Veterinários, S.A.
Rua dos Navegantes, 42, r/c esq. 1200-730 Lisboa
Telefone: 21 392 83 00
Email: mail@vetpermutadora.pt

Titular de Fabrico Responsável pela Libertação de Lote:

Agrototal – Produtos Agroquímicos, S.A.
Rua dos Navegantes, 42, r/c esq. 1200-730 Lisboa
Telefone: 21 392 83 00
Email: mail@agrototal.pt