

ANEXO I

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

CANIAVES pó cutâneo 10 mg/g para cães, gatos, aves canoras e ornamentais

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Substância activa: Carbaril.....5,00 %

Excipientes: Carbonato Cálcio Pull94,00 %

Agrosil 3001,00 %

3. FORMA FARMACÊUTICA

Pó para aplicação cutânea
Pó de cor branco acinzentada

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Espécies - alvo

Cães, gatos e aves canoras e ornamentais (fringilídeos, apodiformes, estrildídeos, passerinos, pitídeos, picnonotídeos, turdídeos, timalídeos, emberizídeos, irenidídeos, estorninhos, tecelões, papa-moscas, pitas, bulbules, zosteropídeos).

4.2 Indicações de utilização, especificando as espécies -alvo

Ectoparasiticida contra carraças (*Dermacentor variabilis*, *Otobious megnini* e *Rhipicephalus sanguineus*), piolhos (*Linognathus spp*), pulgas (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis* e *Pulex irritans*) e ácaros.

4.3 Contra-indicações

Não usar em animais doentes ou em convalescença.
Não tratar animais com lesões cutâneas extensas.
Não tratar cachorros e gatinhos com idade inferior a 3 meses.
Não usar em caso de hipersensibilidade conhecida à substância ativa ou a algum dos excipientes.
Não administrar a animais que destinam a consumo humano.
Não administrar a outras espécies animais para além das indicadas.

4.4 Advertências especiais para cada espécie

Nas aves não pulverizar os ninhos e evitar que medicamento veterinário entre em contacto com os ovos.
Não tratar cães e gatos até às 4 semanas de idade.
Não tratar animais fatigados, excitados, hipertérmicos, doentes ou convalescentes, que apresentem feridas ou escoriações. Evitar que os animais ingiram o medicamento veterinário

4.5 Precauções especiais de utilização

Precauções especiais para utilização em animais

Exclusivamente para uso externo.

Evitar o contacto do pó com os olhos do animal. Em caso de contacto accidental com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água.

Precauções especiais que devem ser tomadas pela pessoa que administra o medicamento aos animais

Lavar as mãos depois de manusear o medicamento veterinário e antes de comer, beber ou fumar.

Evitar o contacto com a pele e os olhos; se isto ocorrer lavar imediatamente com abundante água. Aplicar em zonas bem ventiladas, preferentemente ao ar livre.

Guardar o medicamento veterinário longe de alimentos ou bebidas, incluindo as dos animais.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não contaminar a água de bebedouros e as rações.

A substância ativa é irritante para os olhos e pode causar sensibilização em contacto com a pele. Evitar o contacto direto com os olhos e com a pele durante o tratamento. Usar luvas de borracha.

Em caso de contacto accidental com a pele e/ou com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água. Este medicamento veterinário não deve ser administrado por mulheres grávidas no último trimestre da gravidez.

Em caso de ingestão accidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe a embalagem ou rótulo.

Em caso de suspeita de intoxicação, contactar o Centro Anti-Venenos. Tel: 808250143

4.6 Reacções adversas (frequência e gravidade)

Em gatos ocasionalmente, pode surgir excitação

4.7 Utilização durante a gestação e a lactação

A segurança da utilização do medicamento veterinário durante a gestação dos mamíferos e durante a postura de ovos em aves não foi determinada. Não administrar a aves durante a fase de postura. Não administrar durante a gestação e lactação.

4.8 Interações medicamentosas e outras formas de interacção

Tal como para outros agentes antiparasitários, não usar concomitantemente com outros inseticidas.

4.9 Posologia e via de administração

Uso externo. Polvilhar o animal no sentido inverso ao do pêlo ou das penas, procurando que o pó penetre nas camadas inferiores do pêlo atingindo a pele. Evitar atingir as mucosas (olhos, nariz, etc).

Nas aves, manter intervalos de 4 semanas entre tratamentos. Não utilizar mais de 5 g por ave.

4.10 Sobredosagem (sintomas, procedimentos de emergência, antídotos)

Dada a forma de aplicação é improvável que se produza uma sobredosagem.

Em caso de ingestão oral acidental maciça pode surgir diarreia, náuseas, hipersialia, excitação e convulsões. Enxaguar a boca e dar de beber água abundante. Recomenda-se lavagem gástrica e tratamento sintomático.

Impedir a ingestão de óleos e gorduras que favorecem a absorção a nível intestinal

Em caso de suspeita de intoxicação, contactar o Centro Anti-Venenos. Tel: 808250143

4.11 Intervalo(s) de segurança

Não aplicável.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

Grupo farmacoterapêutico: Ectoparasitícida

Código ATCvet: QP53AE01

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

O medicamento veterinário é composto por Carbaril que é um insecticida da família dos carbamatos. O carbaril actua por ingestão e contacto. A sua eficácia inicial é relativamente rápida tendo uma acção inicial muito pronunciada.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

A sua actividade pode durar até três semanas. Actua inibindo a acetilcolinesterase dos tecidos, causando acumulação da acetilcolina nas uniões colinérgicas dos neurónios e nas uniões mioneurais dos músculos e gânglios autónomos. O envenenamento também altera a função do sistema nervoso central.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista de excipientes

Excipientes:

Carbonato Cálcio Pull	94,00%
Agrosil 300	1,00%

6.2 Incompatibilidades

É incompatível com alcalinos ou substâncias alcalinas, tais como o amoníaco, carbonato de sódio, enxofre de cal e arseniato de cálcio.

6.3 Prazo de validade

Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda: 4 anos.

Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário: utilização imediata

6.4 Precauções especiais de conservação

Manter em local fresco, seco e ao abrigo da luz.

6.5 Natureza e composição do acondicionamento primário

Bisnaga de 100 gramas de capacidade, de polietileno de baixa pressão e alta densidade, provida de tampa com a mesma característica.

6.6 Precauções especiais para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de desperdícios derivados da utilização desses medicamentos

O medicamento veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com os requisitos nacionais. A eliminação do medicamento veterinário e dos seus desperdícios, deve acautelar a contaminação de cursos e de outras fontes de água. Perigoso para peixes. Não contaminar não contaminar fontes, poços e cursos de água com restos do medicamento veterinário.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Morada: Vet Permutadora – Produtos Veterinários, S.A.

Rua dos Navegantes, 48, r/c Esq. 1200-732 Lisboa

Telefone: 21 392 99 80

Email: mail@vetpermutadora.pt

8. NÚMERO DE REGISTO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

580/01/NFVPT

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO

03 de Julho de 2012

PROIBIÇÃO DE VENDA, FORNECIMENTO E/OU UTILIZAÇÃO

Não aplicável.

Data da Revisão do Texto:

Agosto 2016