

PECUSANOL CHAMPÔ ECTOPARASITICIDA

Medicamento de uso veterinário

AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

AIM nº 526/01/12NFVPT

COMPOSIÇÃO

Permetrina.....0,2 %
Butóxido de piperonilo.....1 %
Excipiente q.b.p.....100 %

FORMA FARMACÊUTICA

Champô

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

Embalagem de 250 ml

ESPÉCIES-ALVO

Cão e gato.

INDICAÇÕES

Desparasitação externa (contra pulgas, carraças e outros parasitas externos) de cães e gatos.

Tratamento de parasitoses externas, de cães e gatos, produzidas pelos seguintes parasitas:

Pulgas (*Ctenocephalides canis*; *C. felis*; *Pulex irritans*) e Piolhos *Linognathus spp*

Exclusivamente para uso veterinário.

Medicamento veterinário não sujeito a receita médico veterinária.

MODO E VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

Uso externo. Humedecer o pêlo do animal com água tédida, e ensaboar bem com 10-20 ml de Pecosanol Champô. Evite o contacto com os olhos do animal.

Deixar actuar durante alguns minutos e enxaguar com água abundante. Repetir o tratamento cada 2-4 semanas se necessário.

INTERVALO DE SEGURANÇA

Não aplicável

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS

Reacções adversas

Ocasionalmente podem produzir-se reacções de hipersensibilidade cutânea, que desaparecem ao interromper o tratamento.

Sobredosagem

A utilização do medicamento veterinário provoca intoxicação improvável por sobredosagem.

As doses maiores do que as recomendadas podem provocar nos gatos hiperstesia com excitação, convulsões e colapso. Em caso de ingestão oral maciça surge excitação e convulsões que progridem para uma paralisia e fibrilhação muscular, podendo chegar a produzir a morte por insuficiência respiratória. Geralmente não é necessário um tratamento depois da ingestão, podendo administrar-se catárticos salinos ou uma suspensão de carvão ativado. Em caso de suspeita de intoxicação, contactar o **Centro Anti-Venenos. Tel: 808250143**. Caso detecte efeitos graves ou outros efeitos não mencionados na rotulagem, informe o médico veterinário.

Contra-indicações

Não administrar o medicamento veterinário a animais com menos de 12 semanas de idade

Não administrar a cadelas lactantes.

Não administrar o medicamento veterinário em caso de hipersensibilidade às substâncias activas ou a algum dos excipientes.

Precauções especiais de utilização

Precauções especiais para utilização em animais

Aconselha-se enxaguar com água abundante a cabeça do animal para evitar que o medicamento veterinário entre em contacto com os olhos. No caso de contacto, recomenda-se lavar convenientemente os olhos com água e como soro fisiológico. Se observar que o animal manifesta sintomas de irritação ocular, recomenda-se ir ao médico veterinário.

Precauções especiais que devem ser tomadas pela pessoa que administra o medicamento aos animais

Evitar o contacto com os olhos; se este ocorrer, lavar imediatamente com água abundante. Usar luvas ou lavar as mãos depois de aplicar o medicamento veterinário.

Não comer, beber ou fumar durante a sua manipulação.

Manter afastado de alimentos e bebidas.

Manter fora do alcance das crianças.

Em caso de auto-administração, ingestão, derrame sobre a pele accidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o folheto informativo ou o rótulo.

As pessoas com hipersensibilidade conhecida à substância ativa devem evitar o contacto com o medicamento veterinário, administrar o medicamento com precaução.

Outras precauções

Para um óptimo controlo das pulgas, o medicamento veterinário deve ser utilizado como parte integrante de um programa de controlo destinado a reduzir a população de parasitas no ambiente do animal. O cesto, cama e zonas de descanso, tais como carpetes e sofás, devem ser tratados com um insecticida adequado e devem se aspirados regularmente.

Utilização durante a gestação e a lactação

Não administrar a fêmeas lactantes. Não foi demonstrada a segurança do medicamento veterinário durante a gestação ou a lactação. Administrar apenas em conformidade com a avaliação benefício/risco realizada pelo veterinário responsável.

Interacções medicamentosas e outras formas de interacção

Não deve associar-se com compostos organofosforados.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco, seco e protegido da luz.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS DESPÉDICIOS

O medicamento veterinário não utilizado ou os seus resíduos devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor. O medicamento veterinário não deve ser eliminado nos cursos de água, porque pode constituir perigo para peixes e outros organismos aquáticos. O medicamento veterinário é muito tóxico para peixes e abelhas.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM)

Morada: Vet Permutadora – Rua dos Navegantes, 42, r/c esq. 1200-730 Lisboa

Telefone: 21 392 83 00

Fax 21 390 10 54

Email: mail@vetpermutadora.pt

Titular de Fabrico Responsável pela Libertação de Lote:

DIVASA — FARMAVIC, S.A. (DFV)

Ctra. Sant Hipolit Km 71 8503 Gub-Vac

(Barcelona)

Espanha